

Aus der Heilanstalt Lippstadt i. W.
Spezialklinik für Knochen- und Gelenkranke.
Leitender Arzt: Dr. Joh. Schlaaff.

Nierensteinbildung bei Wirbelerkrankungen.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der

Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 16. Febr. 1937.

von

Else Funck

aus Bonn.

Druck: Hermann Schönershoven, Bonn, Wilhelmstr. 58

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen
Fakultät der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Frhr. v. Redwiß.



Meinen Eltern in Dankbarkeit!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Zu den Krankheitsbildern, die in den letzten Jahrzehnten nicht nur durch verbesserte Diagnostik, sondern auch objektiv zugenommen haben, gehört die Bildung der Nierensteine. Über ihr Zustandekommen ist uns aber noch wenig Sicheres bekannt.

Bevor ich auf die wichtigsten Theorien eingehe, sei zunächst etwas über die Steinarten gesagt.

Je nach der Zusammensetzung unterscheiden wir harn- oder oxalsaure-, Phosphat- oder Cystin-Steine. Alle diese Konkreme, die sich schon äußerlich durch Farbe und Form unterscheiden, können rein und gemischt vorkommen. Die ersteren entstehen meist ohne erkennbare Ursache, während die gemischten Steine meist Folge von entzündlichen Prozessen sind.

Hinsichtlich des Umfanges schwanken diese Steine von Sandkorn- bis Hühnereigröße. Große Steine kommen meist nur solitär vor, während kleine dagegen vielfach in großer Zahl vorhanden sind.

Oftmals finden sich in beiden Nieren Steine; völlig einseitige Steinbildungen sind dagegen gerade bei Wirbelsäulenerkrankungen nachgewiesen worden. Die beiderseitig auftretenden Nierensteine müssen aber nicht immer die gleiche chemische Zusammensetzung haben, sondern es ist sogar häufig der Fall, daß sie verschiedene Bestandteile enthalten.

Es war das Verdienst Scheeles, die Harnsäure als wichtigsten Bestandteil der Steine festzustellen, und dadurch wurden wieder neue Wege für die Erforschung der Nephrolithiasis eröffnet, denn dieses Problem war noch nie gelöst worden trotz aller darauf verwandten Arbeit.

Hippokrates war wohl einer der ersten, welcher dieses Problem zu lösen versuchte. Er nahm an, daß die Harn- bzw. Nierensteine aus Schleim entstehen würden. Eine vollkommen andere Annahme hatte im 16. Jahrhundert dann Paracelsus, der Begründer der neuen Heilmittellehre. Er glaubte, daß es ganz besonders bei solchen Personen zur Nierensteinbildung kommen würde, deren Nahrung eine ausgesprochen phosphatreiche sei. Die dann auf-

tauchende wichtigste Theorie war die von Meckel von Hemsbach, welche etwa 1½ Jahrhundert nach der Paracelsus'schen das Hauptinteresse beanspruchte. Meckel von Hemsbach stellte die Theorie des „steinbildenden Katarrhs“ auf. Auf dieser Theorie bauen viele z. T. heute noch bestehende auf, so diejenigen von Lichtwitz und Schade, um nur die bekanntesten zu nennen.

Es sollen nun im Folgenden kurz die bekanntesten neueren Theorien aufgeführt werden. Es stehen sich da vollkommen gegenfätzliche Meinungen gegenüber. Die einen Forscher wollen als Hauptursache für die Steinbildung die Diathesen annehmen, andere stellen in den Mittelpunkt des Interesses die Bakterien als Zentralkern, welche die Steinbildung herbeiführen sollen, und als letztes erwähne ich die Lichtwitz'schen Behauptungen, daß es sich bei der Steinbildung um einen colloidchemischen Vorgang handelt.

Wenn auch heute schon einige Grundideen über die Steinbildung bekannt sind, so ist die Ursache doch noch recht unklar. Ganz neue Gesichtspunkte brachte die häufig beobachtete Steinbildung bei Wirbelveränderungen oder -erkrankungen auf den Plan.

In der vorliegenden Arbeit sollen nun auf Grund eines ziemlich umfangreichen Materials noch einmal die bisherigen Theorien auf ihre Stichhaltigkeit hin untersucht werden, und einige neue Gedankengänge zur Klärung der immer noch umstrittenen Frage hinzugefügt werden.

Die auffällige Erscheinung, daß Nierensteinbildungen zeitweilig nach Knochenbrüchen, Knochenverletzungen und -erkrankungen auftreten, hat zu den verschiedensten Hypothesen geführt.

Durch die Arbeiten Kurt Müllers (Halle), welche nun ungefähr 40 Jahre zurückliegen, wurde das Interesse für diesen Zusammenhang wesentlich gesteigert. Obwohl dieses Sondergebiet der Medizin bis zu diesem Zeitpunkt nicht unbekannt gewesen war, so war es doch sehr vernachlässigt worden. K. Müller konnte über 10 Kranke berichten, die im Anschluß an eine Wirbelsäulenverletzung Nierensteine bekommen hatten. 8 seiner Fälle waren durch Sektion gesichert worden, und 2 hatten Nierenkoliken mit spontanem Steinabgang. In allen seinen 10 Fällen konnte Müller einen kausalen Zusammenhang zwischen den beiden Erkrankungen feststellen.

In der Folgezeit war es dann Rosenstein, welcher ebenfalls Nierensteinbildung nach Wirbelsäulenverletzung auftreten sah.

Er konnte einen Fall vorstellen, in welchem er als Steinkern ein Blutgerinnsel darstellen konnte. Dies veranlaßte ihn, die Nierensteine in zwei verschiedene Gruppen einzuteilen und zwar in

1. echte traumatische Nierensteine und
2. unechte traumatische Nierensteine.

Die echten nennt er solche, welche außer der Wirbelfäulenverletzung noch eine Mitverletzung der Niere aufweisen. Er nimmt nämlich an, daß bei „echten traumatischen Nierensteinen“ die Steinbildung dadurch erfolgt, daß durch die Mitverletzung der Niere es zu einer Blutung kommt, deren restierendes Blutextravasat dann das Kernmaterial für den späteren Stein bildet. In dem von ihm gezeigten Fall konnte er nämlich auf dem Durchschnitt des Steines den aus Blut bestehenden Kern gegen die äußeren Schichten deutlich abgegrenzt darstellen, und er hatte nach dem Unfall die Nierenblutung klinisch festgestellt, so daß er einen Zusammenhang zwischen der ersten Blutung und dem später erfolgten Steinanfall mit Steinabgang annehmen konnte. Alle „unechten traumatischen Nierensteine“ entstehen nach Rosenstein nach Wirbelveränderungen, bei denen die Niere ungeschädigt geblieben ist.

Es folgten noch eine ganze Reihe Arbeiten anderer Autoren über dieses Gebiet. Die Ansichten über die Häufigkeit des Auftretens der traumatisch bedingten Nierensteine wurden sehr wechselnd dargestellt. Die einen wie Haumann und Mingramm nehmen einen sehr geringen Prozentgehalt an, während K. Müller, Rosenstein und vor allem Taterka fast mit Sicherheit nach einer Wirbelfäulenverletzung eine Steinbildung erwarten. Großmann gibt an, daß er nach versteifenden Wirbelprozessen öfters Steinbildung beobachtet hat, nach Wirbelfäulenverletzungen jedoch fast niemals. Mörl konnte ebenfalls fast nie einen Zusammenhang zwischen Wirbelerkrankungen und Nephrolithiasis feststellen. Er untersuchte weiter noch, um Klarheit in diesen so verschieden beschriebenen Krankheitszusammenhang zu bringen, Patienten mit operierten Rückenmarkstumoren, bei welchen eine Laminektomie erforderlich war und Patienten mit nicht traumatischen Wirbelerkrankungen auf diesen Zusammenhang hin und kam „zu der Feststellung, daß metatraumatische indirekte Nierensteine selten sind und nur ausnahmsweise in der Gefolgschaft der Traumen auftreten, und daß von einer Regelmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit ihrer Erscheinung keineswegs gesprochen werden kann“.

Wir wollen uns nun mit der Entstehungsursache der metatraumatischen Nierensteine befassen. Es bestehen zurzeit vier verschiedene Theorien, welche jede auf ihre Stichhaltigkeit hin untersucht werden soll. Die Mehrzahl der Autoren entschließt sich aber nicht für eine Theorie allein, sondern nimmt für die Entstehung der metatraumatischen Nierensteine mindestens zwei, manchmal sogar drei Ursachen an. Die vier Möglichkeiten, wie Nierensteine nach Wirbelfäulenerkrankungen entstehen können, sind:

1. Die Verletzung bzw. Schädigung der Niere selbst.
2. Die nach Verletzung und Infektion der Harnwege sich häufig entwickelnde Cystopyelitis.
3. Die Änderung im Kalkstoffwechsel bei Wirbelverletzungen, -brüchen und -erkrankung.
4. Die Schädigung des Rückenmarks.

I.

Frische Kontusionsherde in der Niere entgehen sehr leicht den klinischen Beobachtungen und zwar besonders dann, wenn es sich um verhältnismäßig kleine Befunde handelt. Sie werden oft am Lebenden überhaupt nicht wahrgenommen und überraschen gelegentlich auf dem Sektionstisch. Es handelt sich bei diesen Kontusionen meist um solche, die nur zu geringfügigen Blutungen führen, welche entweder im Parenchym oder in der Umgebung der Niere sitzen, falls die Kapsel mitverletzt wurde. Sie haben klinisch wenig Bedeutung und schädigen die Niere kaum. In einigen Fällen allerdings kann sich eine Eiterung und Infektion anschließen, welche dann eine chronisch entzündliche Veränderung der Niere herbeiführen kann. Nach R. L. P a y n e s sollen diese chronisch entzündlichen Veränderungen Anlaß zur Steinbildung geben. Diese Annahme fand z. T. Anklang, z. T. wurde sie aber auch energisch abgelehnt. Eine Klärung der Streitfrage fand erst durch R o s e n s t e i n statt, welcher die traumatischen Nierensteine, wie schon an anderer Stelle erwähnt wurde, in echte und unechte einteilte. Aber selbst R o s e n s t e i n kam zu der Meinung, daß die Nierenblutung nicht der einzige Faktor sein könne, sondern daß es noch andere begünstigende Momente geben müsse. So könnte nach seiner Meinung noch eine vorübergehende Schädigung des Zentralnervensystems statt gefunden haben. Vielleicht aber neigen auch besonders Personen mit konstitutionellen Störungen zu diesem Krankheits-

zusammenhang, die infolge dieser Störung überschüssig viel Salze ausscheiden, welche zur Steinbildung um das Blutgerinnsel gelangen.

Seit dem Rosensteinschen Bericht ist sehr viel mehr auf das gemeinsame Auftreten der beiden Erkrankungen geachtet worden, und daher seit dieser Zeit auch viel mehr Fälle darüber bekannt geworden. Besonders nach Nierenrupturen scheint die Steinbildung doch nicht so selten zu sein, wie früher angenommen wurde. Da die Nierenruptur meist nur einseitig erfolgt, so ist es auch erklärlich, daß die Steinbildung ebenfalls fast ausschließlich einseitig gefunden wurde. Bei den Fällen, wo dieser direkte Zusammenhang zwischen Wirbelverletzung mit Nierenschädigung und Nierensteinbildung festgestellt wurde, handelte es sich zumeist um Stauchungsbrüche der untersten Brust- und obersten Lendenwirbel, also um Verletzungen in einem Teile der Wirbelsäule, der engste topographische Beziehung zu den Nieren hat. Man kann wohl mit Recht annehmen, daß in diesen Fällen es des öfteren zu einer Nierenblutung gekommen ist. Die Blutung braucht durchaus nicht immer klinisch in Erscheinung getreten zu sein, ja sie kann so klein gewesen sein, daß sie völlig symptomlos verlief. Nach der Rosensteinschen Auffassung würde es sich in diesen Fällen um „echte traumatische Nierensteine“ handeln.

Simon berichtet ebenfalls über einen Fall von Fraktur des 3. Lendenwirbels, bei dem fünf Monate nach dem Trauma eine rechtsseitige Nierensteinkolik auftrat. Es war eine Nephrektomie erforderlich, bei welcher ein großer Stein und vier kleine gefunden wurden. In der Niere selbst fand er außerdem noch alte Blutungsherde mit chronischer herdförmiger Nephritis.

Es scheint nach verschiedenen in der Literatur beschriebenen Fällen also nicht ausgeschlossen, daß eine Beziehung zwischen der Wirbelfraktur und Nephrolithiasis besteht, und daß als ätiologischer Faktor die Blutung wahrscheinlich ist. Insbesondere gilt dieses für einseitig auftretende Nierensteine.

II.

Es sind schon lange Beziehungen zwischen Steinbildung und infektiös-entzündlichen Erkrankungen bekannt. Schon bei der Erforschung der Steinbildung allgemein kam man auf diesen Punkt zu sprechen, und es waren vor allem Aschoff und sein Schüler

Kleinfeldt, welche diesen Standpunkt vertraten. Sie waren es auch, welche den Namen „Entzündungssteine“ prägten und die Nierensteine in entzündliche und nicht entzündliche einteilten. Natürlich wurde später versucht, diesen Begriff auch auf die Nierensteinbildung nach Wirbelerkrankungen zu übertragen.

Bei Wirbelerkrankungen und -verletzungen kommt es sehr häufig zu einer Rückenmarksreizung, wenn nicht sogar zu einer totalen Lähmung. Die Folge davon ist natürlich ein Versagen der normalen Blasenfunktion. Da der Harn nicht mehr häufig genug entleert werden kann oder mittels Katheter entnommen werden muß, bleibt die Infektion nicht lange aus. Aber auch auf andere Weise kann es zur Harninfektion kommen, selbst auf dem Blutwegen kann sie erfolgen. Eine Cystitis, Cystopyelitis und Pyelonephritis ist gar keine so seltene Begleiterscheinung bei einer Wirbelveränderung. In den meisten Fällen ist sie vorhanden, wenn auch manchmal nur vorübergehend. Ihr Dasein wurde für die Steinbildung verantwortlich gemacht, und in der Literatur sind reichlich Fälle bekannt, bei denen eine Pyelitis allein zur Steinbildung führte.

Woher kommt es nun, daß in dem einen infizierten Fall es zur Steinbildung kommt und bei dem anderen nicht? Dieser Frage sind schon viele Forscher gegenüber getreten, und es war vor allem das Verdienst Hryntschaks, der nachwies, daß bei fast allen auf diese Weise entstandenen Steinen der Kern aus Staphylokokken bestand. Dadurch wurde der Beweis erhärtet, daß bestimmte Mikroorganismen für die sekundäre Steinbildung von ätiologischer Bedeutung sind. Es können aber nicht alle Bakterien in Frage kommen, denn sonst müßte die Steinbildung häufiger auftreten. Es scheint erwiesen zu sein, daß die Steinbildung von gewissen Bakterienarten abhängig ist, und zwar stehen an erster die Kolibakterien und Staphylokokken, es folgen als weitere die Streptokokken. Man ist weiter noch zu der Annahme gekommen, daß es manche Stämme noch innerhalb der drei genannten Arten geben muß, die besonders zu Steinbildung Anlaß geben. Bewiesen ist dieses zwar nicht, doch kann kaum daran gezweifelt werden, da zu vieles darauf hindeutet. Daher mag es wohl auch kommen, daß manchmal bei einer Koliinfektion des Harns nur eine harmlose Pyurie ohne große Beschwerden auftritt und manchmal eine rapide Versteinerung und eitrige Zerstörung der Nieren. Um ganz sicher beweisen zu können, daß

bestimmte Bakterienstämme die Nierensteinbildner sind, müßten alle Steine bei Wirbelerkrankungen auf einen bestimmten Bakterienkern hin untersucht werden.

Nach Mörl handelt es sich „in der überwiegenden Mehrzahl von Steinen, die nach Wirbelfäulen- und Rückenmarksverletzungen auftreten, um sekundär-entzündliche Steine, bei denen in kausal-genetischer Beziehung der aufsteigenden Infektion meist die einzige, jedenfalls aber wichtigste ätiologische Bedeutung zukommt“.

III.

Die auffällige, aber länger schon bekannte Erscheinung, daß Nierensteinbildungen häufig nach Knochenbrüchen auftreten, hat zu der naheliegenden Annahme geführt, daß die durch die Callusbildung hervorgerufene Umstimmung im Kalkhaushalt des Organismus zur Steinbildung führen könnte. Daß es sich hierbei aber nicht nur um eine Verschiebung im Kalkstoffwechsel auf Grund von Knochenneubildung handelt, zeigt die Häufigkeit des Auftretens von Nierensteinen auch bei anderen Knochenkrankungen.

Auf dem großen Gebiet der Knochenpathologie fallen bei genauer Untersuchung die relativ häufigen Steinbildungen nach Wirbelerkrankungen auf, obwohl in der Literatur nur wenig über den inneren Zusammenhang zwischen Änderung im Kalkhaushalt und Nierensteinbildung zu finden ist. Die ersten Berichte über diesen vermutlich inneren Zusammenhang stammen von Kocher, und zwar kam er darauf, weil er häufiger nach schweren Wirbelfrakturen Steinbildung beobachtete. Er versuchte dieses Zusammenreffen dadurch zu erklären, daß er die bei Frakturen auftretenden Knochenzerfallsprodukte dafür verantwortlich machte. Nach seiner Meinung soll die abgebaute und zerfallene Knochensubstanz, nachdem sie resorbiert worden ist, als Kalkphosphate im Harn ausgeschieden werden, was zur Steinbildung den Anlaß geben soll. Hellström und Schwarz nehmen ebenfalls eine Überschwemmung des Harns mit Kalksalzen an.

Außer den Autoren, welche einen übermäßigen Kalkgehalt im Harn als ätiologischen Faktor nachwiesen, gibt es noch einige andere, welche den erhöhten Kalkgehalt im Blut als Ursache vermuten.

Litten zeigte in seinen experimentellen Arbeiten, daß die

abgestorbenen Epithelzellen eine hohe Verwandtschaft zum Kalk besitzen, wie es überhaupt eine schon längst feststehende Tatsache ist, daß alle Nekrosen Kalkfänger sind. Er klemmte zeitweise Nierengefäße ab und konnte danach in den Nierenepithelien Kalkablagerungen feststellen. Warum es in diesen geschädigten Geweben sehr viel leichter zu Kalkablagerungen gelangt, ist noch nicht eindeutig klargestellt.

Es interessiert besonders, wo der Kalk herrührt, der zu diesen eigentümlichen Verkalkungen führt. Es genügt nach den Ansichten einer ganzen Reihe von Forschern lediglich der Kalk, den wir regelmäßig mit der Nahrung zu uns nehmen.

M. B. Schmidt nannte dies die „dystrophische Form der Verkalkung“. Haben wir nun eine Knochenerkrankung, wie z. B. einen Wirbelbruch, so werden von der Wundstelle Kalksalze ins Blut geschwemmt, welche eine Verkalkung in einem geschädigten Gebiet hervorrufen bzw. begünstigen können. Es ist also durchaus möglich, daß eine schon geschädigte Niere, und das ist Bedingung, zur Verkalkung kommt. Die Schädigung kann eine ganz leichte gewesen sein, es braucht lediglich eine geringfügige Kontusion mit Schädigung einiger Nierenepithelien vorgelegen zu haben.

Um es noch einmal kurz zu wiederholen: Es gibt eine Theorie, welche besagt, daß es nach Knochenerkrankungen und hier besonders nach Wirbelfrakturen durch Resorption von Kalksalzen, die von der Knochenwundfläche ins Blut gelangen und einen erhöhten Blutkalkgehalt verursachen, durch Resorption zur Bildung von Kalkkonkrementen im traumatisch geschädigten Nierengewebe kommen kann.

IV.

Auch über die neurogene Theorie ist schon viel debattiert worden, und dementprechend sind die Ansichten hierüber sehr verschieden. In der Hauptsache stehen sich zwei Annahmen gegenüber. Während ein Teil der Forscher annimmt, es handele sich in den Fällen der metatraumatischen Nierensteinbildung um eine Innervationsstörung der Niere, sagen die anderen, daß es nicht allein diese angenommene Innervationsstörung sein könne, die zur Steinbildung führe, sondern daß dabei stets noch eine Mitverletzung der Niere stattgefunden habe.

Endlich gibt es hierbei noch eine dritte Gruppe, welche in den

Vordergrund eine Cystopyelitis stellen, die durch die gleichzeitige Lähmung der Blase eintritt.

K. Müller und Kümmell kamen nach eigenen Beobachtungen zu der neurogenen Hypothese. Sie nahmen an, daß die Steinbildung durch eine akute nekrotisierende Nephritis hervorgerufen würde, welche durch Läsion des Rückenmarks eintritt. Später tritt nach ihrer Meinung dann noch eine Harnstauung und Infektion hinzu, welche das Wachstum des Steines begünstigen.

Mikulicz führte die Steinbildung auf eine trophische Störung der Nieren infolge Rückenmarksverletzung zurück.

Holländer begründete eine andere neurogene Theorie, welche später eine ganze Reihe Anhänger hatte. Seine Lehre gründete sich auf die Tatsache, daß es durch die traumatische Unterbrechung des Reflexbogens zu einer Lähmung der abführenden Harnwege kommt und infolgedessen zu einer Harnstauung, welche, wie schon an anderer Stelle gesagt wurde, die Steinbildung begünstigen soll. Ob Steinbildung eintritt, hängt im wesentlichen von der Dauer der Lähmung des uropoetischen Systems ab.

Diese letztgenannte Lehre wurde von Seefisch, Mingramm, Küfter, Garré u. a. noch dahin erweitert, daß sie alle übereinstimmend als letzte Folge der durch die Rückenmarkschädigung bedingten Blasenlähmung eine Cystopyelitis als letzte Ursache der Nierensteinbildung nach Wirbelveränderungen annehmen. Es handelt sich also nach ihrer Meinung nicht um eine alleinige Ursache, sondern um eine Kette von aufeinanderfolgenden Störungen, bis es zur Nierensteinbildung kommt. Ein Beispiel für diese Folgerungen brachte Itoh. Er konnte einen Fall vorbringen, an dem sich die einzelnen Phasen verfolgen ließen. Der Patient hatte durch eine Innervationsstörung eine Ureterlähmung mit nachfolgender Harnstauung und Infektion. Dieser Fall ist insofern von besonderer Bedeutung, als es sich bei ihm um eine rein halbseitige Störung in jeder Beziehung handelte, und die beiden Körperhälften in ihrer Reaktion verglichen werden konnten. Auf der rechten Seite erfolgte weder Ureterlähmung noch Infektion, während links sämtliche drei Ursachen für die zuletzt genannte Annahme vorhanden waren.

Taterek lehnt die beiden bisher erwähnten neurogenen Theorien, nämlich die der nekrotisierenden Nephritis und die der Harnstauung mit nachfolgender Infektion infolge Ureter- und Nieren-

beckenlähmung vollkommen ab und bringt ganz andere Gesichtspunkte in den Vordergrund. Er steht auf dem Standpunkt, daß die Ursache der traumatischen Nierensteinbildung in einer Verletzung und Schädigung der sekretorischen Fasern des vegetativen Nervensystems der Niere zu suchen sei. Durch diese Störung käme es zu einer qualitativen Änderung des Urins und somit zur Steinbildung, wobei er sich dann im Wesentlichen auf die kolloidchemischen Eigenschaften des Harns stützt und in der Änderung derselben den wesentlichen ätiologischen Faktor sieht.

Wie wir gesehen haben, sind in der Literatur, besonders in der der letzten Jahre häufiger Nierensteine nach Wirbelerkrankungen beobachtet worden und soviel auch versucht wurde, die Ursache der Nierensteinbildung zu ergründen, so konnte bis heute noch kein einheitliches Bild darüber gewonnen werden. Zum größten Teil stützten sich die Forscher auf die eine oder andere der vier beschriebenen Theorien, oder aber sie versuchten eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen.

Es sollen daher in der vorliegenden Arbeit die in der Heilanstalt Lippstadt i. W. — Spezialklinik für Knochen- und Gelenkkrankheiten — beobachteten zahlreichen Fälle von Wirbelerkrankungen und Wirbelveränderungen noch einmal auf den Zusammenhang mit Nierensteinbildung hin untersucht werden, und die einzelnen Theorien daran auf ihre Stichhaltigkeit geprüft werden.

Es wurden zu diesem Zwecke sämtliche 406 Fälle von Wirbelfäulenerkrankungen und -verletzungen aus den Jahren 1926-1936 auf diesen eigenartigen Zusammenhang hin untersucht. In der Hauptsache handelte es sich bei diesen Wirbelkranken um Spondylitis tuberculosa; aber auch manche andere Wirbelerkrankung wurde diagnostiziert. Von unseren 406 Kranken hatten 288 eine Tuberkulose der Wirbelfäule, dazu sind noch 31 stark tuberkulös Verdächtige zu rechnen, bei denen die Diagnose aber leider nicht einwandfrei durch Röntgenbild, Abzweig, Kultur usw. sicherzustellen war. Sie sind aber wohl doch als tuberkulös positiv anzusehen, da sehr vieles darauf hinweist. Ich glaube, sie können ohne große Bedenken zu den tuberkulösen Wirbelerkrankungen gezählt werden, und somit steigt unsere Zahl von 288 auf 319.

Die übrigen 87 Kranken verteilen sich auf die mannigfaltigen,

sonst noch an der Wirbelsäule vorkommenden Krankheiten und Unfälle, sowie Deformitäten, wobei rachitische Skoliosen (15), Jugendkyphosen (13) und Wirbelpalten den größten Teil ausmachten.

Bei der Untersuchung auf Nierensteine wurde auf die hauptsächlichsten Symptome der Nierensteine geachtet. Es wurde in erster Linie auf Nierensteinkoliken und Steinabgang gefahndet. Als weiteres wurde großer Wert auf den Sedimentbefund gelegt, falls noch andere Gründe zu Steinverdacht Anlaß gaben. Außer Sediment, Kolik und Steinabgang wurde noch Gewicht auf das Röntgenbild gelegt, und als letztes füge ich die Sektion noch an, welche in einigen Fällen zur letzten Klarheit führte.

Es wurden in der Abhandlung genaueste Unterschiede darüber gemacht, ob es sich um das tatsächliche Vorhandensein eines Nierensteines handelte, oder ob dieser nur aus einigen Befunden zu vermuten war, was manchmal nicht mehr zu entscheiden war.

Von den 406 von mir verfolgten Kranken hatten 20 einen positiven Nierensteinbefund und 58 waren fraglich, wobei ich bemerke, daß es in diesen Fällen nicht durchaus sicherzustellen war, da die Patienten zum großen Teil nur einen Sedimentbefund aufgewiesen hatten und infolge von Entlassung nicht mehr eingehend auf einen Stein untersucht werden konnten. 7 von den 58 Fällen hatten außer dem Sedimentbefund noch eine Schmerzhaftigkeit in der Nierengegend aufzuweisen. Da es sich jedoch zumeist um tuberkulöse Spondylitiden handelte, war es nicht einwandfrei festzustellen, ob die Schmerzhaftigkeit tatsächlich von der Niere herrührte oder ob es sich um Abzeßschmerzen von dem von der Wirbelzerstörung herrührenden Abzeß handelte.

Von den 288 tuberkulös Wirbelkranken, bzw. 319, wenn die tuberkulös fraglichen mitgezählt werden, wiesen 16 eine Nierensteinbildung auf. Die übrigen vier Nierensteinbildner verteilten sich mit je 1 auf Bechterew, rheumatische Erkrankung der Wirbelsäule, auf Coccen-Arthritis und Wirbelfraktur.

Fraglich, ob ein Nierenstein vorlag, waren von den tuberkulösen Spondylitiden 53, die restlichen, nicht klargestellten 5 verteilten sich mit 2 Fällen auf Jugendkyphosen und mit je 1 Fall auf Epiphyseinförderung, Wirbelfraktur und Wirbelpalte.

In der folgenden Tabelle soll eine kurze Übersicht über das

Auftreten bzw. Nichtauftreten der Nierensteine nach Wirbelfäulen-erkrankungen und anderen -veränderungen dargestellt werden, um einen besseren Überblick über die untersuchten Fälle zu geben.

Wirbelkranke	Gef. Zahl	+	Stein ?	Ø
Tuberkulose	288	16	51	221
Tuberkuloseverdacht	31	—	2	29
Osteomyelitis	5	—	—	5
Arthritis deformans	5	—	—	5
Lues	6	—	—	6
Rachitische Skoliosen	15	—	—	15
Jugend-Kyphosen	13	—	2	11
Wachstumsbeschwerden	2	—	—	2
Schmorl'scher Knoten	1	—	—	1
Epiphysenstörung	2	—	1	1
Bechterew	5	1	—	4
Wirbelverletzungen	2	—	—	2
Wirbelfrakturen	4	1	1	2
Rheumat. Erkrankungen	6	1	—	5
Unspezif. Entzündungen	4	—	—	4
Infekt-(Kokken) Arthrit.	1	1	—	—
Wirbelspalten	14	—	1	13
Aktinomykose	1	—	—	1
Carzinom	1	—	—	1
	406	20	58	328

W. B. 26 Jahre. Eingeliefert am 18. 6. 1934.

Vorgeschichte: Früher Lungenentzündung. 1929 „Knochenentzündung“. Okt. 30 Beginn der Erkrankung. Bis 33 auswärtig behandelt. 34 erneute Beschwerden, Schmerzen im Rücken und auf der Brust.

Befund: Sehr guter A.Z. Innere Organe o.B. W.S.: der ganzen Länge nach steif. Unt. Extrem.: Beweg. stark eingeschränkt und schmerzhaft.

Diagnose: Infekt.-Arthritis.

Krankheitsverlauf: Nach 2 Tagen spontaner Steinabgang. In der

Folgezeit des öfteren spontaner Steinabgang.

Urin: Ery ++

Röntg.: zahlreiche Steine in beiden Nieren.

28. 5. 35: Pat. wird zur Kur nach Bad Driburg verlegt.

H. K. 28 Jahre. Eingeliefert am 15. 4. 31.

Vorgeschichte: Seit 1924 wechselnd Gelenkschmerzen. 1929 plötzlich heftige Schmerzen in der linken Hüfte. Heilstättenbehandlung, in dieser Zeit vollkommen versteift.

Befund: A.Z. sehr gut.

Innere Organe o. B.

Wirbelsäule: vollkommen fix.

Gibbus Ø

Klopfempfindlich Ø

Abzeß Ø

Fistel Ø

Obere Extr. o. B. Untere Extr. fast versteift.

Diagnose: Klin. (Internist) und röntg. Arthritisme.

Krankheitsverlauf: 17. 4. 31. Pat. gibt an, daß beim Wasserlassen häufig Steinchen und Sand abgehen. Urin: Ery +, vereinz. Leuko.

2. 9. Nierensteinkolik. Abgang von 2 kleinen Steinen und Gries.

6. 10. 32: Pat. wird versuchsweise beurlaubt. In letzter Zeit keine Nierenkolik mehr gehabt.

Moorbadekur in Nenndorf.

K. Sch. 23 Jahre. Eingeliefert am 26. 6. 29.

Vorgeschichte: Seit 1925 nach Unfall Schmerzen in Thorax und W.S. Wirbeltbc. außerhalb festgestellt.

Befund: Schlechter A.Z. Innere Organe o. B.

Wirbelsäule: Untere B.W.S. besonders am 9., 11. B.W. klopfempfindlich.

Stauchungsschmerz +

Gibbus Ø

Fix. der unt. B.W.S. und der ganzen L.W.S.

Reflexe: Patel. Refl. etwas gesteigert, sonst o. B.

Diagnose: Klin. und röntg.: Bechterew.

Krankheitsverlauf: 21. 8. 29 Nierenkolik.

Urin Ery +++

9. 12. 29 erneute Nierenkolik.

Rö.-A. linke Niere feinverdächtig.

25. 4. 30 Entlassung. Moorbäder in Nenndorf.

E. S. 27 Jahre. Eingeliefert am 18. 9. 36.

Vorgeschichte: 1927 Unfall. Wirbel-Fraktur. Mit Korsett entlassen, bis 1931 getragen.

1934, Juni, Nierenkolik rechts. Steinabgang. 1935 Aug. erneute Nierenkolik rechts. Kein Steinabgang.

17. Aug. 36 wieder Schmerzen in r. Nierengegend. Keine ausgesprochene Kolik. Seither Beschwerden, deshalb Überweisung nach hier.

Befund: A.Z. gut. Herz und Lungen o.B. Nierengegend bds. druckempfindlich.

Urin: Spur Alb., Ery +.

Rö.-A.: r. Niere Stein +.

Diagnose: Klin. und röntg.: Nierensteine rechts, alte abgeheilte Fraktur des 4. LW., arthritische Veränderungen 3.—5. LW.

Krankheitsverlauf: Keine Kolik mehr.

Flachlagerung wegen Wirbelveränderung.

31. 10. 36 Entlassung.

Wirbel-Tuberkulosen

H. A. 11 Jahre. Eingeliefert am 3. 6. 28.

Vorgeschichte: Seit Nov. 27 Spasmen an beiden Beinen, seit 1926 krank.

Befund: Elender blasser Junge, mit dicht an den Leib gezogenen Beinen im Bett liegend. Starke Krampfstellung in allen Beengelenken. Enorme Spitzfußhaltung, aber ausgleichbar. Bei jeder Bewegung springen die Beine ruckartig in die Luft.

Reflexe: Patellar Clonus +

Achill. Clonus +

Babinski?

Herz: über Aorta systol. Geräusch.

Lunge: o. B.

Wirbelsäule: Vom 4.—11. B.W. sehr starker Buckel.

Druckschmerz Ø

Klopfempfindlichkeit Ø

R. Knie: stark aufgetrieben.

Konturen verstrichen.

Deutl. Erguß nachweisbar.

Diagnose: Klin. und röntg.: Tbc. 5. B.W. bis 1.L.W., r. Knie Tbc.

Spaft. Lähmung beider Beine.

Krankheitsverlauf: Glissonische Webe. Streckverband. Lähmung und Spasmen vorübergehend verschwunden, kehren aber immer wieder, daher am 14. 10. 32 Förster'sche Operation. Wundheilung pp. Cloni verschwunden. 5. 12. 32 Cystitis, Blasen-spülung. 10. 1. 33 Blasenstein.

22. 2. 33 Sektio alta zur Entfernung des Blasensteines, wall-nußgroßer Stein.

21. 9. 33 Knierefektion rechts.

26. 7. 34 Entlassung. Pat. geht an zwei Stöcken flott und sicher.

24. 8. 36 Neuaufnahme zur Reparatur der Kniehülle und neuer orthopädischer Schuhe. 30. 8. 36 plötzlich stark blutiger Urin, Schmerzen ☉. Pat. gibt an, dies zu Hause schon öfter gehabt zu haben.

Cystoskopie: Blase stark entz., am Boden massenhaft Gries und Fibrin. Aus dem linken Ureter entleert sich „Müll“.

Perabrodilfüllung der Nieren: Steine nicht sichtbar.

Entlassung am 5. 9. 36.

W. B. 31 Jahre. Eingeliefert am 9. 1. 36.

Vorgeschichte: 1917 „Rückgratverkrümmung“ angeblich nach Unfall. 1920 Schmerzen in rechter Hüfte, bald zahlreiche Fisteln. Fi. sollen von WS gekommen sein. Hüfte sehr schlechte Stellung, die noch heute besteht.

Seit 1925 alle Fisteln geschlossen. Pat. kommt jetzt zur Korrektur der Hüfte, hat zurzeit keine Beschwerden.

Befund: Guter AZ. Innere Organe o. B.

BWS.: starke Scoliose der LWS. und der unt. BWS. nach r. konvex. Fix. untere BWS. und LWS. Klopfempfindlichkeit ☉. Gibbus der LWS. +++

Zahlreiche alte eingezogene Fi.-Narben R. Hü.: enorme Fehlstellung, in der Umgebung zahlreiche festgeschl. reaktionslose Narben. (Fi.)

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 1.—4. LW. mit Kontrakturstellung der rechten Hüfte.

Krankheitsverlauf: 13. 1. 36 Hüftgelenkrefektion. Secundäre Wundheilung. 8. 6. 36 plötzlich heftige Schmerzen in li. Nierengegend, Urinverhalt.

Rö.-A. Nieren: l. 3 erbfengr. Steine bis in den Ureter. Cystoskopie: L. Niere Funktion Ø. Steinverschluß. Trotz aller Versuche, die Diurese anzuregen, Erfolg Ø. Op.: Im obersten Teil des link. Ureters ein knapp erbfengroßer Stein und zahlreiche kleine Steine. Exitus infolge Urämie.

W. B. 29 Jahre. Eingeliefert am 11. 10. 32.

Vorgeschichte: 1926 trockene Rippenfellentzündung, sonst nie krank. Beginn der jetzigen Erkrankung 1928 mit Schmerzen im Rücken. Seit Jan. 32 Verschlechterung. Steifigkeit in den Beinen und Störungen beim Wasserlassen.

Befund: Guter A.Z.

Lunge: Atemgeräusche stellenweise etwas unrein.

Herz: o. B.

Leib: etwas resistent.

WS.: Fix. der BWS.

Gibbus vom 5.—9. BW.

Klopfempfindlichkeit Ø.

Refl.: o. B.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 6.—9. BW.

Krankheitsverlauf: Liegekur. Am 8. 2. 33 verläßt Pat. gegen ärztlichen Rat die Anstalt. 27. 4. 33 Pat. kommt wieder zur stat. Aufnahme. Zu Hause dauernd außer Bett gewesen. Buckel spitzer geworden.

Refl. gesteigert.

Pat.-S-Refl. +++

Pat. Clonus rechts +

Urin geht häufig spontan ab.

3. 4. 34 stark blutiger Urin. Sed. Ery massenhaft. Cystoskopie: Stein rechts? Am 6. 5. 35 plötzlich heftigste Schmerzen in r. Nierengegend. Cystoskopie: R. Niere Funkt. Ø. 17. 9. 35 plötzlich unter heftigsten Schmerzen Abgang eines bohnen großen Steines.

1. 10. 35: Pat. wird mit Korsett zur Amb. entlassen.

März 36 Nachuntersuchung: Buckel praktisch Ø. Keine Beschwerden mehr.

E. B. 19 Jahre. Eingeliefert am 25. 11. 31.

Vorgeschichte: 1927 Spondylitis. 10 Mon. Gipsbett. Seit März 1931 Hüftgelenkentzündung. Jetzt erneut Beschwerden.

Befund: Bei gutem A.Z. und sonst normalem Organbefund Fix. der LWS., bogenförmiger Gibbus der LWS. Fisteln Ø.

Diagnose: Klin. und röntg.: Tbc. 3.—5. LW., Tbc. des Hüftgelenks.

Krankheitsverlauf: 18. 2. 32 plötzlich in linker Nierengegd. heftige kolikartige Schmerzen.

Urin: Ery +++

24. 4. 32 erneuter Steinanfall, dieses Mal rechts.

28. 5. 32 Abgang von zwei erbsengroßen Steinen.

Hüfte: stark eiternde Fisteln. Keine Nierenkolik mehr. 2. 9. 36 auf Wunsch entlassen. Wirbelproc. ausgeheilt. Hüfte noch krank.

M. E. 49 Jahre. Eingeliefert am 2. 9. 35.

Vorgeschichte: 1931 Pleuritis exsudativa.

Seit 1933 Schmerzen im Rücken. Wirbel-Tbc. außerhalb schon festgestellt. Gipsbett. Nov. 34 Nierenkolik.

Befund: Guter A.Z. Lungen o. B. Herz: Systolische Unreinheit Aktion leicht irregulär. Bauch o. B.

Wirbelsäule: Fix. der unteren BWS. und LWS. Fisteln Ø.

Klopfempfindlichkeit 5.—12. BW. Gibbus 10.—12. BW.

Reflexe: gesteigert. li. mehr als re.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 11. BW. — 1. LW.

Krankheitsverlauf: 5. 9 35 komplette Lähmung beider Beine.

Glissonfchwebe. 17. 1. 36 Beinbewegung frei, noch Spur ataktisch. 31. 1. 36 Beinlähmung sehr gut gebessert. 11. 8. 36 plötzlich heftigste Schmerzen im rechten Unterbauch.

Urin: Alb. Spur, Sed. Leuko + Ery +.

Nierensteinkolik. Pat. noch stationär.

F. K. 31 Jahre. Eingeliefert am 1. 6. 26.

Vorgeschichte: Früher nie krank. Seit Nov. 23 Fi. im Rücken. Auswärtige Krankenhausaufnahme. Am 1. 6. 26 Verlegung nach hier.

Befund: Bei mäßigem A.Z. und normalem Organbefund Fix. der LWS. Skoliose, Fix. Klopfempfindlichkeit der WS. Ø.

Re. Hüfte: massenhaft stark eiternde Fisteln. Alb. $2\frac{1}{2}/100$.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 2. u. 3., 4. u. 5. LW. Tbc. re. Hüfte.

Krankheitsverlauf: Pat. geht ständig zurück. 8. 9. 32 Exitus.

Sektion: R. Niere o. B.

L. Niere zahlreiche Höhlen mit Käse. In einem der Kelche erbfengroßer braunschwarzer Stein.

E. K. 21 Jahre. Eingeliefert am 20. Juli 31.

Vorgeschichte: Früher angeblich nie krank gewesen. 1929 feuchte Rippenfellentzündung. Seit 1½ Jahren Steifigkeit im Rücken. Schmerzen in der Lendenwirbelfäule beim Husten.

Befund: Bei sonst normalem Organbefund und gutem A.Z. Fix. der WS. von den unt. BW. abwärts. Gibbus vom 11. B.W.— 4. LW. Klopfempfindlichkeit der WS. Ø. Fi. Ø.

Diagnose: Klin u. röntg. Tbc. des 1. und 2. LW.

Krankheitsverlauf: Liegekur. Im Sept. heftiger Druckschmerz links neben der LWS., dort gewisse Resistenz. Abszeß. März 32 Reflexe gesteigert, Rückenmarksreizung. Auf der Röntg.-A. vom März 33 wird zufällig ein kirschkerngroßer Nierenstein festgestellt. Urinbefund o. B.

Nov. 33 wird Pat. mit Korsett beurlaubt. Bis Juli 36 fanden 4 Nachuntersuchungen statt, Pat. ist beschwerdefrei, hat in der Zwischenzeit niemals Nierenkoliken oder Steinabgang bemerkt.

K. K. 21 Jahre. Eingeliefert am 1. 8. 29.

Vorgeschichte: Seit Dez. 28 Beschwerden im Rücken. Sommer 29 Senkungsabszeß r. hinten.

Auswärts Tbc. der unt. BWS. festgestellt.

Befund: Mäßiger A.Z.

Herz o. B. Lunge: Schallverkürzung Ø. Feinblasige R.G. über beiden Spitzen, r. mehr als l.

Wirbelfäule: Skoliose +.

Fix. der unt. BWS. und oberen LWS.

Refl. gesteigert. Klopfempfindlichkeit Ø. Mannsfautgroßer Abszeß über der re. Lumbalgegend, deutl. fluktuierend.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 10. und 11. BW.

Krankheitsverlauf: Liegekur.

5. 11. 29 plötzlich heftige Nierenkolik links. Makr. und mikr. reichlich Blut im Urin.

14. 9. 29 erneute heftige Nierenkolik li. Cystoskopie: Sonde stößt in 10 cm Höhe im linken Ureter auf Widerstand. 27. 11. 29 spontaner Abgang eines roggkerngroßen Steines. Da Wirbelproc. fortschreitet, und Pat. elender wird, am 6. 2. 30

Intercostotransversektomie. Pat. erholt sich danach gut und verläßt am 9. 12. 32 die Anstalt. Keine Nierensteinkolik mehr nach dem Steinabgang gehabt.

O. M. 25 Jahre. Eingeliefert am 3. 1. 31.

Vorgeschichte: 1928 Beginn der Erkrankung. Pat. hat sich angebl. erhoben. Schmerzen im Rücken. Verschiedentlich in ärztlicher Behandlung gewesen. Diagn.: Muskel-Rheuma. Seit Aug. 30 Buckel bemerkt. Oktober 30 WS. Tbc. außerhalb festgestellt, seither immer gelegen.

Befund: Bei mäßigem A.Z. und sonst normalem Organbefund wird ein flacher Gibbus der unteren BWS., vom 8.—12. BW. reichend, festgestellt. BWS. fast vollk. fix. LWS. leicht fix. Klopfempfindlichkeit Ø. Beinrefl. gesteigert.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 11. und 12. BW.

Krankheitsverlauf: Liegekur. Am 4. 5. 31 plötzlich heftige Schmerzen in rechter Seite. Nierenkolik.

Urin: Sed. Ery +++++, mehr. Leuko. Nieren-Rö.-A.-Stein suspekt.

Cystoskopie: Im linken Ureter walnußgroße Vorbuchtung, Stein. Steinabgang. 8. 12. 31 Typische Nierensteinkolik re.

Urinbefund: massenhaft Ery. Rö.-A. erbsengroßer Stein im rechten Nierenparenchym.

19. 5. 32. sechs bis erbsengroße Steine spontan abgegangen. 13. 12. 32 mit Korsett entlassen. Bis 1936 insgesamt sechs Nachuntersuchungen. Noch drei Nierensteinkoliken seit der Entlassung gehabt. Wirbelprozeß ruhig.

G. M. 4^{1/2} Jahre. Eingeliefert am 23. 2. 35.

Vorgeschichte: Seit zwei Jahren krank. Fall aufs Steißbein. Verschiedentlich im Krankenhaus gewesen. Zuletzt 8 Mon. Gipsbett und Streckverband. Verlegung nach hier.

Befund: Bei mäßigem A.Z. und sonst normalem Organbefund zeigt sich Gibbus in Höhe des 4.—5. LW. Klopfempfindlichkeit im Bereiche des 4. LW.-Kreuzbein. Zahlreiche sezernierende Fisteln am r. Oberschenkel, r. Leiste, r. und l. Glutäus.

Diagnose: Wirbel-Tbc. mit schwer fistelnden Abfc.

Krankheitsverlauf: Liegekur. Im Urin häufiger Ery +, +, und ++++. Alb. 4⁰⁰⁰. Nach vorübergehender Besserung Verschlechterung des Zustandes. 7. 8. 36 Exitus infolge Meningitis tbc.

Wegen Unklarheiten über die Nierenerkrankung (Stein, Tbc., Amyloid?) Sektion. L. Niere o. B. R. Niere atrophisch, stark gelappt, Nierenbecken erweitert. Tbc. Ø. Zahlreiche stecknadelkopf-linsengroße Steine.

A. N. 26 Jahre. Eingeliefert am 2. 6. 33.

Vorgeschichte: Seit 1932 krank. Außerhalb WS.-Tbc. festgestellt. Juli 32 Extirpation der l. Niere.

Befund: Guter A.Z. Herz und Lungen o. B. Bauch bds. resistent.

S.A. wohl bds. + im Pfoas. 16 cm lange Nierenop.-Narbe o. B. WS.: Fix. der ganzen BWS. Abzeß +. Gibbus der unteren BWS. Klopfempfindlichkeit der ganzen BWS. Refl. o. B.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 11. und 12. BW.

Krankheitsverlauf: Liegekur. 28. 8. 33 spontan Abgang von massenhaft Nierengries, darunter kleine Steine. Cystoskopie: am Blasenfundus zwei etwa linsengr. Steine. Pat. geht zurück. Fisteln stark sezernierend. 2. 5. 34 Thrombose am li. Bein. 28. 8. 34 erneut Abgang von Nierengries und Steinen. 12. 1. 35 kolikartige, heftige Schmerzen in re. Seite. Anurie. Einführen eines Kath., Urin Ø.

Exitus. Sektion: L. Niere fehlt. R. Niere massenhaft Nierengries.

F. R. 28 Jahre. Eingeliefert am 21. 11. 35.

Vorgeschichte: Seit Ende 1930 krank. Lungen-Tbc. Heilstättenbehandlung. Seit Anfang 33 Rückenschmerzen. Wirbel-Tbc. Febr. 35 angebl. Blasensteine, seitdem häufiger Steinabgang. 4. 6.—4. 9. 36 Rippenfellentzündung, seither mehr Husten, Auswurf und Gewichtsverlust.

Befund: Schlechter A.Z. Herz o. B. Klopfeschall auf beiden Lungen verkürzt. Atemgeräusche diffus verschärft. R.G. Ø. Wirbelsäule: Fix. +. Abzeß +. Klopfempfindlichkeit Ø. Gibbus ganze BWS. 7.—9. BW. springt stark vor. Refl. gesteigert.

Urin: makrosk. stark bluthaltig. Sed. Ery +++++. Sputum Tbc ++.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 5.—10. BW. Lungen-Tbc.

Krankheitsverlauf: Pat. geht weiter zurück. Häufiger Schmerzen in r. Nierengegend, häufiger Steinabgang. 31. 3. 36 Exitus.

Sektion: In beiden Nieren Steine +.

L. Niere histol. Tbc. +.

R. Niere histol. Tbc. Ø.

H. S. 28 Jahre. Eingeliefert am 4. 8. 31.

Vorgeschichte: Seit Sommer 27 Schmerzen in der l. Seite, außerhalb auf Spond. behandelt. 1930 Fi. in der r. Seite, die heute noch offen sind.

Befund: Guter A.Z. Herz o. B. Lunge: L. Oberlappen geringe S.V. Atemgeräusche hier unrein. Atemgeräusche r. Oberlappen ebenfalls unrein. Bauch: Leber ragt etwas unter Rippenbogen hervor, sonst o. B. W.S.: Fix. von der oberen BWS. abwärts. Abceß +. Fi. r. Seite. Klopfempfindlichkeit Ø. Gibbus des 1. und 2. LW. gering, Refl. o. B.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 12. BW. und 1. LW.

Krankheitsverlauf: Liegekur 2. 3. 32 spontan blutiger Urin. Sed. Ery ++. Kein Druckschmerz in Nierengegend. Nieren-Rö.-A.: Kein sicherer Anhaltspunkt für Steine. 9. 1. 33 wieder Blut im Urin. Abrodil-Füllung der Nieren i. v.: L. Nierenbecken Aussparung, Stein? Cystoskopie vergeblich. 9. 4. 33 heftige Nierensteinkolik r. Urin: Sed. Ery ++.

Kleiner zackiger Stein abgegangen. In der Folgezeit verschiedlich Steinabgang. 16. 5. 34 mit Korsett beurlaubt. Bis 1936 5 Nachuntersuchungen. Pat. ist beschwerdefrei, keine Nierenkolik und kein Steinabgang mehr.

H. Sch. 9 Jahre. Eingeliefert am 5. 1. 33.

Vorgeschichte: Seit 2 Jahren Schmerzen im Rücken. Behandlung außerhalb mit Gipsbett.

Befund: Bei gutem A. Z. und sonst normalem Organbefund Fix. der LWS. Gibbus der LWS. Klopfempfindlichkeit Ø. Reflexe o. B.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 3. und 4. LW.

Krankheitsverl.: Liegekur. 26. 4. 33 Urin Sed.: Ery +++, Leuko +. 23. 4. 34 Urin: massenhaft Ery, Leuko vermehrt. Cystoskopie: Re. Ureter nicht deutlich sichtbar, sonst o. B. Da noch zeitweise Ery auftreten, Perabrodil-Füllung der Nieren: re. Nierenbecken Stein +? 9. 9. 35 Rö.-A. Nieren zeigt deutliches Wachstum der Steine. 12. 9. 35 sehr heftige Kopfschmerzen, Tp. 38,1. Schmerzen beim Wasserlassen, Eiter aus Harnröhre. Urin: 9^{0/100} Alb., Sed. Ery +++++, wenig Leuk. Abstrich: Kokken ++. Rö.-A. (Perabrodil) wallnußgroßer Stein re.. Da bisherige The-

rapie vergeblich, am 23. 10. 35 Nierenoperation r. Extirpation. Wallnußgroßer Stein +. Op. gut überstanden. 27. 12. 35 Nierenkolik links. Anurie. Rö.-A. haselnußgroßer Ventilstein li. Operation: Entfernung eines mandelgroßen typischen Ventilsteins.

4. 9. 36 Pat. steht mit Korsett auf. Seit der Operation keine Anzeichen mehr für einen Nierenstein.

K. Sch. 28 Jahre. Eingeliefert am 2. 1. 30.

Vorgeschichte: 1926 Nierenentzündung. Seit 1927 Schmerzen in der li. Seite. Mehrfach auf Rheuma behandelt worden. Seit Ende 28 Verdickung in der li. Lendengegend. Verschiedentlich dort punktiert worden, zuletzt Fistel dort. Angeblich seit Aug. 29 wieder geschlossen.

Befund: Bei gutem A.Z. und sonst normalem Organbefund findet sich eine Klopfempfindlichkeit des 3.—5. LW. Gibbus Ø. Über Beckenschaukel li. 5 Fistelnarben, 3 fest geschlossen, 2 borkig. Refl.: sehr lebhaft.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 4. und 5. LW.

Krankheitsverlauf: Liegekur. 9. 7. 30 spontaner Steinabgang, Beschwerden Ø. Urin o. B. 23. 2. 31 mit Korsett entlassen. Zwei Nachuntersuchungen bis Sept. 31. Pat. ist beschwerdefrei.

K. Sp. 19 Jahre. Eingeliefert am 11. 1. 1932.

Vorgeschichte: Seit Winter 29 krank. Behandlung außerhalb auf Wirbel-Tbc. Gipsbett.

Befund: A.Z. mäßig. Innere Organe o. B. W.S.: Fix. der BWS Fisteln Ø.

Klopfempfindlichkeit Ø.

Gibbus der BWS. +. Reflexe gesteigert. Pat. Clonus +.

Diagnose: Klin. und röntg. Tbc. des 6.—11. BW.

Krankheitsverlauf: Liegekur. Incomplete Lähmung beider Beine.

4. 2. 33 Urin: Sed. Ery +++++.

Leuko ++++, Cystoskopie: Nieren o. B. 18. 4. 33 Schmerzen in li. Nierengegend. Urin Ery +++++.

Rö.-A.: Nieren: Li. Niere steinverdächtig. Noch verschiedentlich Nierenschmerzen in der folgenden Zeit. Pat. schlägt Nierenoperation ab. 14. 9. 34 beurlaubt.

In der nun folgenden Tabelle soll eine Übersicht darüber erfolgen, welche Symptome das Vorhandensein eines Nierensteines nach Wirbelveränderung, -verletzung und -erkrankung sicherten.

		gesichert durch:				
Name	Erkrankung	Sediment	Stein Abgang	Röntg. Aufn.	Sektion	
1	W.B. Inf. Arthr.	++	++	++	Ø	lebt
2	H.K. Arthritisme	+	++	Ø	Ø	lebt
3	K.Sch. Bechterew	+++	Kolik +	Ø	Ø	lebt
4	E.S. 3.—5. LW. n. Unf. arthr. Veränder.	++	+	+	Ø	lebt
5	H.A. 5. BW.—1. LW. Tbc.	++++	++	Ø	Ø	lebt
6	W.B. 1.—4. LW.	+	Kolik +	Ø	+	
7	W.B. 4.—9. BW.	++++	Kolik +	Ø	Ø	lebt
8	E.B. 3.—5. LW.	+	+	Ø	Ø	lebt
9	M.E. 11. BW. — 1. L.W.	++	Kolik +	Ø	Ø	lebt
10	F.K. LW. Tbc.	++	Ø	Ø	+	lebt
11	E.K. LWS.-Tbc.	Ø	Ø	+	Ø	lebt
12	K.K. 10.—11. BW.	++	+	+	Ø	lebt
13	O.M. 11.—12. BW.	++++	++	Ø	Ø	lebt
14	G.M. 4. LW.—3. KRBW.	+++	Ø	Ø	+	
15	A.N. 11.—12. BW.	Ø	+	+	Gries	+
16	F.R. 5.—10. BW.	++++	++	+	+	
17	H.S. 12. BW. 1. LW.	++++	+	Ø	Ø	lebt
18	H.Sch. 3.—4. LW.	++++	α Op nachg.	Ø	Ø	lebt
19	K.Sch. 4.—5. LW.	Ø	++	Ø	Ø	lebt
20	K.Sp. 6.—11. BW.	++++	Nierengegd beds. druckschm	li. + ?	Ø	lebt

	Name	Rückenmark Schädigung	Niere	Abcess
1	W.B.	+	r. u. li.	Ø
2	H.K.	Ø	re. ? li. ?	Ø
3	K.Sch.	Ø	li.	Ø
4	E.S.	Ø	re.	Ø
5.	H.A.	+	re. u. li.	re. u. li.
6	W.B.	Ø	li.	+ ?
7	W.B.	+	re.	re. u. li.
8	E.B.	Ø	re. u. li.	re. u. li.
9	M.E.	+	re.	re. u. li.
10	F.K.	Ø ?	li.	re. u. li.
11	E.K.	+	li.	re. u. li.
12	K.K.	+	li.	re. u. li.
13	O.M.	Ø	re. u. li.	re. u. li.
14	G.M.	Ø	re.	re. u. li.
15	A.N.	Ø	re. (li. fehlt d. Op.)	re. u. li.
16	F.R.	+	re. u. li.	re. u. li.
17	H.S.	Ø	re.	re. u. li.
18	H.Sch.	+	re. u. li.	re. u. li.
19	K.Sch.	Ø	re.	re. u. li.
20	K.Sp.	+	li.	re. u. li.

Aus dieser Aufstellung ersehen wir, daß es sich in der Mehrzahl unserer Nierensteinkranken nach Wirbelprozessen um tbc. Spondylitiden handelte. Sie alle wiesen eine Abzeßbildung auf, die klinisch und röntgenologisch festzustellen war.

Bei 9 Patienten trat im Verlaufe der Krankheit eine Rückenmarkschädigung auf, welche teilweise zur vollkommenen Lähmung beider Beine, Blase und Mastdarm führte, teilweise aber nur leichter Art war. 11 von diesen 20 Fällen hatten keinen krankhaften neurologischen Befund.

Bei nahezu zwei Drittel (13) unserer Fälle traten die Nierensteine einseitig auf, die restlichen (7) waren doppelseitig steinkrank.

Der Gesamtüberblick über unser Material ergibt, daß bei den Wirbeltuberkulosen in 5% aller Fälle sichere Nierensteinbildung nachgewiesen werden konnte, und daß 16 = 6% nierensteinverdächtig waren.

Wir geben zu, daß ein Sedimentbefund mit vielen Erythrocyten etc. allein kein eindeutiger Beweis ist, daß jedoch örtliche Schmerzen oder echte Kolikanfälle mit Erythrocyten im Urin den Steinverdacht als reichlich gesichert dann bestätigen, wenn eine tuberkulöse Nierenerkrankung mit größter Wahrscheinlichkeit abgelehnt werden mußte.

Sicher nierensteinfrei waren 78,4%.

Auch bei unseren zahlreichen Fällen ließ sich eine einheitliche Ursache für die Steinbildung nicht nachweisen.

Eine traumatische Blutung im Nieren-Parenchym als tiefere Ursache der Konkrementbildung muß in unseren Fällen abgelehnt werden.

Eine aufsteigende Infektion infolge Blasenlähmung nach Rückenmarkschädigung käme höchstens in 5 Fällen in Frage.

Uns erscheint als das Wahrscheinlichste, daß die Schädigung des nervösen Apparates, sei es des Rückenmarks selber oder der zu den Nieren abgehenden Nervenstränge, die Disposition zur Steinbildung schafft.

Ob diese Störungen in den Nervenbahnen durch Piaödem, durch Eiterdruck, durch pachymeningitische Schwarten oder durch toxische Wirkungen des paravertebralen Abscesses hervorgerufen werden, ist vorerst nicht zu entscheiden.

Auch ist die Frage noch offen, ob die erwähnte Schädigung des nervösen Apparates nur zu einer Stauung des Abflusses (infolge Ureterkrampfes oder Ureterlähmung) oder zu einer Schädigung der Nierenzellsubstanz selbst führt.

Inwieweit etwa nervös bedingte Störungen im Chemismus der Nieren dabei beteiligt sind, ist noch völlig unklar.

Sicher erscheint, daß die Wirbelschädigung hauptsächlich dann zur Steinbildung führt, wenn der Herd in der Nähe des Nierenlagers sitzt; eine Fernwirkung durch weiter entlegen sitzende Wirbelerkrankungen ist nicht nachzuweisen. Das spricht dafür, daß die Nierensteinbildung nicht durch Kalkanreicherung im Blut hervorgerufen wird, sondern daß die Nierensteinbildung durch die örtlichen Vorgänge in der Nähe der Nieren bedingt sein muß.

Wir glauben, daß die mechanische Beeinträchtigung des Urinabflusses durch den immer vorhandenen Wirbelabsceß gerade bei den Tuberkulösen des 11. Brust- bis 4. Lendenwirbels von allergrößter Wichtigkeit ist. Da es Wirbeltuberkulösen ohne Absceßbildung nicht gibt (Schlaaff), so muß die pralle Auffüllung der Psoasloge unbedingt zu einer Verlagerung der Nieren mit Druck auf das Nierenbecken, weiterhin der Harnleiter mit Kompression und verzögertem Urinabfluß führen. Diese Verlagerung der Niere und besonders des Ureters konnten wir in sehr zahlreichen Fällen röntgenologisch und cystoskopisch nachweisen.

Durch diese in 1. Linie mechanische Erklärung werden alle Forderungen, die man früher für die Steinbildung für notwendig hielt, erfüllt:

1. eine kräftige Callusbildung bei Wirbelfraktur mit mechanischem Druck auf Nierenbecken und Ureter,
2. die Paraplegie mit ihren schweren Sekundärschäden,
3. die traumatische Läsion der Nieren.

Die These der Kalkanreicherung in der Blutbahn erscheint uns theoretisch interessant, aber nicht bewiesen.

Der Satz von der Störung der colloidchemischen Zusammensetzung des Urins ist als Hypothese fesselnd, aber vorerst infolge Mangels chemischer und physiologischer Erkenntnis auf diesem Gebiet zur Erklärung der Steinbildung unzureichend.

Zum Schlusse meiner Arbeit möchte ich Herrn Dr. Schlaaff für die liebenswürdige Überlassung der Arbeit und seine freundliche Unterstützung herzlichst danken.

Literaturverzeichnis:

1. Bürger: Z. urol. Chir. 28 (1929).
2. Gold: Die Chirurgie der Wirbelsäule.
3. Gottstein: Handbuch der Urol. Bd. IV.
4. Gottstein: Handbuch d. spez. path. Anatomie und Hist. VI/2 1934.
5. Hellström: Zentralblatt f. Chir. 1936 Nr. 34. Acta chir. scand. (Stockholm) 1924.
6. Holländer: Berl. klin. Wschr. 48 (1919).
7. Hryntschak: Klin. Wschr. 64 (1933).
8. Israel: Moderne Diagn. und Diff.-Diagn. der Nieren- und Harnleitersteine.
9. Kaäris und Zeiß: Beitr. z. mod. Diag. u. Ther. d. Nephrolithiasis.
10. Kleinfeldt: Die Harnsteine, ihre Physiographie und Pathogenese.
11. Kümmel: Z. Urol. 2, 193 (1907).
12. Lichtwitz: Die Praxis der Nierenkrankheiten.
13. Lilla: Riforma med. 1933, H. 46.
14. Meyer: Klin. Chir. 1926, 138, H. 2.
15. Mingramm: D. Ztschr. f. Chir. 94.
16. Mörl: Z. Urol. 27 (1933). Med. Klin. 1931.
17. Müller, K.: Arch. klin. Chir. 50, 601 (1895).
18. Posner: Nierenstein und Trauma (Kraus Brugsch).
19. Rosenstein: Ztschr. f. urol. Chir. 21, H. 5/6, 1927.
20. Ruge: Verhandlungen der deutschen orthopädischen Gesellschaft 193, Hefte für Unfallheilkunde.
21. Seefisch: D. Ztschr. f. Chir. 94.
22. Simon: Ztschr. f. Urol. Bd. 21, H. 6 (1927).
23. Stacher: Ztschr. f. Urol. 1933.
24. Stahl: Anat. Phys. u. Chir. der veg. Nerven d. oberen Harnwege und der Niere. Ztschr. f. Urol. Bd. 29.
25. Taterka: Z. Neur. 105, 661 (1926).
26. Wagner: Mtschr. f. Unfallhlk. 1912.
27. Weber: Z. Urol. 25, 36 (1931).
28. Weingarten: Wien. klin. Wschr. 211—213.

Lebenslauf:

Ich wurde am 1. 5. 1909 zu Bonn als Tochter des Prof. Otto Funck geboren. Oftern 1916 kam ich auf die Volksschule in Beuel bei Bonn. Dort blieb ich ein Jahr und besuchte seit 1917 das Städt. Oberlyzeum mit rg. Studienanstalt und Frauenschule in Bonn, wo ich Oftern 1930 mein Abiturientenexamen machte. Anschließend studierte ich Medizin an den Universitäten Bonn und Würzburg. Die ärztliche Vorprüfung bestand ich im Herbst 1932, das ärztliche Staatsexamen im Winter 1935 in Bonn. Seit dem 1. 2. 36 bin ich am Evang. Krankenhaus Lippstadt tätig.